

PROVA SCRITTA N. 2

Il sig. Gianni, di anni 38, si reca dal medico di medicina generale perché da alcune settimane presenta malessere, tosse secca e persistente, febbre e astenia con calo di peso. Il medico prescrive una radiografia del torace urgente che evidenzia un infiltrato fibronodulare apicale destro. Si decide quindi il ricovero in Malattie Infettive e l'esecuzione dell'esame colturale dell'escreato. La diagnosi è di polmonite tubercolare. Il sig. Gianni vive con la moglie e tre figli in età prescolare.

**1. Quale agente infettante è la causa dell'infezione del sig. Gianni?**

\_\_\_\_\_

**2. Per quali motivi è richiesto l'isolamento nel caso del sig. Gianni?**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il paziente viene isolato in stanza singola.

**3. Inserisci negli spazi liberi gli elementi che caratterizzano la stanza da isolamento:**

La stanza è a pressione \_\_\_\_\_ controllata rispetto alle aree circostanti con numero di \_\_\_\_\_ ricambi d'aria/ora. La stanza deve essere dotata di zona \_\_\_\_\_; la porta rimane \_\_\_\_\_.

**4. Quale dispositivo è indicato utilizzarlo, tutti coloro che accedono alla stanza del paziente per proteggere le vie respiratorie?**

\_\_\_\_\_

Il paziente deve essere trasportato in radiologia per l'esecuzione di una TAC:

**5. Cosa indossa il paziente per controllare la dispersione ambientale dei microorganismi?**

\_\_\_\_\_

Il sig. Gianni è in terapia con: Rifampicina 600 mg. 1 cp (Rifadin), Isoniazide 200 mg. 1 cp (Nicizina), Piridossina 300 mg. 1 cp (Vitamina B6), Paracetamolo 1000 mg. 1 cp.

**6. Elencare almeno 5 azioni da compiere per prevenire errori nella somministrazione dei farmaci al sig. Gianni**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Il sig. Gianni, portatore di lenti a contatto, riferisce preoccupato all'infermiere che da qualche giorno le sue urine e le lenti a contatto hanno assunto una colorazione rosso-arancio.

**7. A cosa può essere attribuita la causa?**

\_\_\_\_\_

**8. Perché nella terapia antitubercolare deve essere sempre aggiunta la vitamina B6?**

\_\_\_\_\_

E' necessario sottoporre a screening i famigliari del sig. Gianni

**9. La reazione di ipersensibilità di tipo ritardato che compare dopo l'infezione tubercolare può essere rilevata attraverso:** \_\_\_\_\_

**In che cosa consiste il test?** \_\_\_\_\_

**La lettura del test va eseguita a distanza di quante ore?** \_\_\_\_\_

**La positività del test è indicativa di malattia in atto o testimonia solamente l'avvenuta infezione, passata o presente?** \_\_\_\_\_

