

QUESTIONARIO**3****Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia**

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 2 POSTI DI "COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO - INFERMIERE - CATEGORIA D"

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 0018000009 - Versione 00000

1. La Piramide delle Evidenze è:

- A. una classificazione dei lavori scientifici secondo uno schema che pone alla base della piramide gli studi preliminari (su modelli animali o in vitro) e all'apice della piramide le revisioni sistematiche e le Meta-analisi
- B. una classificazione dei lavori scientifici secondo uno schema che pone alla base della piramide le revisioni sistematiche e le Meta-analisi e all'apice della piramide gli studi preliminari (su modelli animali o in vitro)
- C. una classificazione dei lavori scientifici secondo uno schema che vede alla base della piramide le revisioni sistematiche e le Meta-analisi e all'apice della piramide gli studi di coorte
- D. nessuna delle risposte è corretta

2. Devi infondere 300ml di soluzione Fisiologica 0.9% in 10 ore. Devi utilizzare un deflussore. Sapendo che 30 gocce erogate con il deflussore corrispondono a 1 ml, a quante gocce al minuto devi regolare il deflussore?

- A. 10 gocce/minuto
- B. 15 gocce/minuto
- C. 20 gocce/minuto
- D. 30 gocce/minuto

3. Un paziente deve assumere 50 mg di antibiotico in sospensione orale. Avendo a disposizione il dosaggio di 600 mg in 60ml, quanti ml devono essere somministrati?

- A. 12 ml
- B. 6 ml
- C. 10 ml
- D. 5 ml

4. La Raccomandazione n.17, Dicembre 2014, del Ministero della Salute recante "Raccomandazione per la riconciliazione della terapia farmacologica" in tema di ricognizione specifica che:

- A. Il professionista (medico, infermiere, ostetrica, farmacista) individuato dalla procedura e che abbia parte attiva nel processo terapeutico, effettua la Ricognizione nell'immediatezza della presa in carico del paziente e comunque entro 24 ore dalla stessa, tranne che nelle situazioni di emergenza o qualora le informazioni essenziali non siano immediatamente disponibili ...
- B. Il professionista (medico, farmacista) individuato dalla procedura e che abbia parte attiva nel processo terapeutico, effettua la Ricognizione nell'immediatezza della presa in carico del paziente e comunque entro 12 ore dalla stessa, tranne che nelle situazioni di emergenza o qualora le informazioni essenziali non siano immediatamente disponibili ...
- C. Il professionista (medico) individuato dalla procedura e che abbia parte attiva nel processo terapeutico, effettua la Ricognizione nell'immediatezza della presa in carico del paziente e comunque entro 24 ore dalla stessa, tranne che nelle situazioni di emergenza o qualora le informazioni essenziali non siano immediatamente disponibili ...
- D. nessuna delle risposte è corretta

5. La Raccomandazione n.13, Novembre 2011 (aggiornata al 1 Dicembre 2011) del Ministero della Salute, recante "Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie", in tema di gestione della terapia farmacologica specifica che:

- A. i pazienti in terapia con farmaci che provocano un'alterazione dello stato psicofisico nonché le associazioni di 4 o più farmaci, indipendentemente dal tipo, debbono essere monitorati rispetto al rischio di cadute
- B. i pazienti in terapia con farmaci che provocano un'alterazione dello stato psicofisico debbono essere monitorati rispetto al rischio di cadute
- C. i pazienti in terapia con associazioni di almeno 2 farmaci, indipendentemente dal tipo, debbono essere monitorati rispetto al rischio di cadute
- D. nessuna delle risposte è corretta

6. Qual è la complicanza più grave della trombosi venosa profonda?

- A. Ulcera maligna malleolare
- B. Cisti di Baker
- C. Neoplasia epatica
- D. Embolia polmonare

7. Quali tra le seguenti lipoproteine vengono in genere comunemente chiamate "colesterolo buono"?

- A. HLD
- B. VLDL
- C. HDL
- D. LDL

8. Le feci picee sono:

- A. liquide
- B. color argilla
- C. con melena
- D. verdognole

- 9. Secondo la Raccomandazione n. 12, Agosto 2010 del Ministero della Salute "Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci "Look-Alike/Sound-Alike", quale delle seguenti direttive, emesse per evitare errori dovuti allo scambio di farmaci LASA, è falsa:**
- A. prestare particolare attenzione alla conservazione dei farmaci (anche di quelli sul carrello della terapia): disporre separatamente, sia in Farmacia che in reparto, nonché negli ambulatori, quei farmaci con nomi e/o confezionamento simili oppure evidenziarne la somiglianza, utilizzando metodi e strumenti (anche contrassegni supplementari, codici colore, "allerte") purché condivisi tra farmacia e reparti e diffusi dalla Direzione sanitaria
 - B. sono accettate le richieste verbali o telefoniche, in assenza del medico sul posto, purché lo stesso trascriva la prescrizione, su supporto cartaceo o informatico, entro 24 ore dall'indicazione verbale o telefonica data
 - C. precisare nelle prescrizioni la forma farmaceutica e la via di somministrazione: in caso di dubbio consultare il medico prescrittore o il farmacista e per la congruenza della prescrizione accertarsi anche dell'indicazione terapeutica
 - D. evitare l'uso di abbreviazioni, soprattutto se le prescrizioni e le richieste dei farmaci sono scritte a mano oppure usare abbreviazioni condivise
- 10. Relativamente ai fattori di rischio per la coronaropatia (Linee Guida per la prevenzione dell'aterosclerosi del Ministero della Salute - settembre 2004) quale tra le seguenti affermazioni è falsa:**
- A. il rischio aumenta con l'aumentare dell'età
 - B. il rischio è maggiore per gli uomini rispetto alle donne nella fascia di età precedente alla menopausa
 - C. dopo la menopausa il rischio tra i due sessi diventa molto simile
 - D. l'aterosclerosi porta, superati gli 85 anni, ad una stabilizzazione del rischio di malattie cardiovascolari
- 11. Quale tra i seguenti principi attivi è costituente dei farmaci ipoglicemizzanti orali:**
- A. sulfamidico
 - B. metformina
 - C. derivato dell'acido butirrico
 - D. nessuna risposta è corretta
- 12. Quali delle seguenti affermazioni sulla terapia del diabete è vera:**
- A. l'insulina causa cecità
 - B. le persone in terapia con insulina possono viaggiare solo se hanno a disposizione un frigorifero per conservare il farmaco
 - C. in caso di diabete di tipo 2 si deve sempre somministrare insulina per tutta la vita
 - D. nessuna risposta è corretta
- 13. Cosa non valuta la PUSH TOOL:**
- A. lunghezza x larghezza della lesione
 - B. quantità di essudato prodotto dalla lesione
 - C. tipo di tessuto presente sul letto di ferita
 - D. odore della ferita (a che distanza è percepito e in che condizioni)
- 14. Quale tra le seguenti è una scala di valutazione per il rischio di insorgenza di lesioni da pressione:**
- A. scala Abbey
 - B. scala Braden
 - C. scala Conley
 - D. scala UCLA
- 15. La prevenzione terziaria:**
- A. riduce la frequenza dei casi esistenti di una malattia
 - B. riduce la comparsa dei nuovi casi di una malattia
 - C. riduce la gravità di una malattia inguaribile
 - D. nessuna delle risposte è corretta
- 16. La colpa professionale può essere riconducibile a:**
- A. negligenza, preterintenzione, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
 - B. dolo, negligenza e imprudenza
 - C. preterintenzione, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
 - D. nessuna delle risposte è corretta
- 17. Considerando il trend demografico e l'andamento delle malattie croniche in Italia ritieni maggiormente adeguata al bisogno sanitario della popolazione un'assistenza infermieristica orientata:**
- A. ad una presa in carico pro-attiva e allo sviluppo della self care
 - B. all'estensione di modelli organizzativi di assistenza funzionale
 - C. all'attivazione di aree di maggior autonomia infermieristica nelle situazioni di emergenza
 - D. nessuna delle risposte è corretta

18. La scala di Braden esamina i seguenti parametri:

- A. percezione sensoriale, umidità cutanea, attività (grado di attività fisica), mobilità (capacità di controllare e modificare la posizione del corpo), alimentazione, frizione/scivolamento
- B. umidità cutanea, attività (grado di attività fisica), mobilità (capacità di controllare e modificare la posizione del corpo), alimentazione, scivolamento/cadute
- C. numero di farmaci assunti, attività (grado di attività fisica), mobilità (capacità di controllare e modificare la posizione del corpo), alimentazione, cadute
- D. nessuna delle risposte è corretta

19. La piramide di Maslow fa riferimento a:

- A. un modello motivazionale dello sviluppo umano basato su una gerarchia di bisogni. Alla base della piramide ci sono i bisogni essenziali alla sopravvivenza mentre salendo verso il vertice si incontrano i bisogni più immateriali
- B. un modello motivazionale dello sviluppo umano basato su una gerarchia di bisogni. Alla base della piramide ci sono i bisogni più immateriali mentre salendo verso il vertice si incontrano i bisogni essenziali alla sopravvivenza
- C. un modello assistenziale infermieristico basato su una gerarchia di bisogni. Alla base della piramide ci sono i bisogni individuali mentre salendo verso il vertice si incontrano i bisogni sociali
- D. nessuna delle risposte è corretta

20. Al controllo degli esami ematochimici di un paziente, operato da 7 giorni di stabilizzazione di frattura di femore, noti un valore anomalo. Qual dei seguenti valori è opportuno segnalare tempestivamente al medico:

- A. D-Dimero: 1000 ng/ml
- B. Emoglobina: 15,1 g/dl
- C. Creatinemia: 0,9 mg/dl
- D. Ematocrito: 40%

21. Il tenesmo può essere definito come:

- A. sensazione di necessità impellente di mingere associata a spasmo doloroso non seguito da emissione di urine
- B. minzione difficoltosa
- C. distensione addominale provocata da una eccessiva produzione e accumulo di gas
- D. incapacità di concentrazione delle urine

22. Il valore massimo del Glasgow Coma Score è:

- A. 15
- B. 8
- C. 3
- D. 30

23. Assistendo un paziente affetto da morbillo:

- A. in aggiunta alle misure precauzionali standard, applichi le misure precauzionali per la trasmissione da via aerea
- B. in aggiunta alle misure precauzionali standard, applichi le misure precauzionali per la trasmissione da contatto
- C. applichi le misure precauzionali da contatto
- D. nessuna risposta è corretta

24. Il D.M. 14 settembre 1994 n. 739 all'art. 5 indica, per la formazione infermieristica post - base, diverse aree. Individua la risposta corretta.

- A. sanità pubblica, salute mentale - psichiatria, geriatria, area critica
- B. sanità pubblica, salute mentale - psichiatria, geriatria, case manager
- C. coordinamento, infermieristica legale e forense
- D. nessuna risposta è corretta

25. Quale, tra le seguenti aritmie cardiache, è potenzialmente mortale se non trattata immediatamente?

- A. Flutter atriale
- B. Fibrillazione ventricolare
- C. Fibrillazione atriale
- D. nessuna risposta è corretta

26. Nel metodo sperimentale la variabile dipendente:

- A. non è manipolata o manipolabile, ma solo osservabile nel campione
- B. è quella manipolata dallo sperimentatore, ma può anche essere misurata
- C. può essere manipolata, ma non può essere misurata
- D. nessuna risposta è corretta

27. Si è in presenza di emottisi quando compare:

- A. sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
- B. sangue dal naso
- C. sangue dal cavo orale con il vomito
- D. nessuna risposta è corretta

28. Si è in presenza di febbre remittente:

- A. quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura si abbassa senza raggiungere valori normali
- B. quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura torna su valori normali
- C. quando la temperatura si mantiene costantemente al di sopra della norma con oscillazioni non superiori a 0, 5°C
- D. nessuna risposta è corretta

29. I modelli funzionali secondo Gordon sono:

- A. 11
- B. 15
- C. 8
- D. 10

30. Si intende per IRCCS:

- A. istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
- B. istituto di ricovero e cura a carattere sanitario
- C. istituto di ricovero e cura a carattere specialistico
- D. nessuna risposta è corretta

